

مهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي التوحد خلال فترة الحجر الصحي جراء فيروس كورونا كوفيد (19)

نادية بوضياف³

سعاد بوسعيد²

أحمد خروبي^{1*}

جامعة قاصدي مرياح ورقلة (الجزائر)^{1,2,3}

The verbal communication skill among the autistic child during the Covid virus 19 lockdown

Ahmed Kharoubi^{1,*} Souad Boussaid² Nadia Boudiaf³

trostkkie@gmail.com souadboussaid54@gmail.com nadia_boudiaf@hotmail.fr
University of Kasdi Merbah Ouargla (Algeria)

Receipt date: 19/11/2020; Acceptance date: 26/04/2021; Publishing Date: 31/08/2021

Abstract. The current study aims at revealing the level of verbal communication skill of the autistic children during the Covid-19 virus lockdown in the city of Ghardaïa.

To achieve the objectives of the study, we adopted the descriptive approach, the study sample consisted of (40) autistic children who were selected by from the centers and associations of people with special needs in Ghardaïa.

The verbal communication skill scale was applied, as the study tool. The results indicated that there was a low level of verbal communication skill among the study sample during the lockdown period, and there were no differences in the level of verbal communication skill according to age and gender, with the parents lack of continuity to train their autistic children on communication skill during the Covid-19 lockdown.

Key words. Verbal Communication skill, Autism Spectrum Disorder , Covid Virus-

-1-

ملخص. هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى مهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي التوحد طيف التوحد خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 بمدينة غرداية، و لتحقيق اهداف الدراسة اعتمدنا استخدام المنهج الوصفي، بحيث تكونت عينة الدراسة من (40) طفلاً ذي اضطراب طيف التوحد اختيروا بالطريقة القصدية على مستوى مراكز وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بغريان، كما تم تطبيق مقاييس مهارة التواصل اللفظي، وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً، تبين وجود مستوى منخفض لمهارة التواصل اللفظي لدى عينة الدراسة خلال فترة الحجر الصحي، إضافةً لعدم وجود فروق في مستوى مهارة التواصل اللفظي حسب السن والجنس، مع عدم وجود استمرارية لدى الوالدين لتدريب الطفل على مهارة التواصل اللفظي خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن الكوفيد 19.

الكلمات المفتاحية مهارة التواصل اللفظي، اضطراب طيف التوحد، فيروس كوفيد 19.

*corresponding author

1. إشكالية الدراسة

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم (11 مارس 2020) بأن فيروس الكوفيد 19 جائحة عالمية، نتيجة ارتفاع عدد الحالات المصابة به خارج منطقة بداية ظهوره بالصين، كذا زيادة عدد الدول المنتشر فيها، مما استدعي من المنظمة إقرار توصيات للحد من تفاقم الوضعية || مائية، متمثلة في "الحجر الصحي و الاجتماعي" (Domenico & Vanelli, 2020) حيث تم تطبيق ذلك في العديد من الدول التي اتخذت إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار العدوى، على غرار الجزائر التي كانت سباقة في تنفيذ هاته التوصيات ابتداء من (12) 2020 بإصدارها لقرارات بتعليق العديد من الانشطة كما اعلنت على الرسمية الحجر الصحي بالمنزل، مراكز ذوي الاحتياجات

أثرت هاته الإجراءات على الجانب التعليمي للأطفال، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة كحالات التوحد، نظراً لحاجتهم حيث أصدر المركز الوطني للدراسات والاعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة و توحد متکفل بها على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنياً حسب السنة (2963) بلغ عدد الحالات الذكور (2244)، أما الإناث (719) ، فالاطفال الذين عمرهم بين (03) في حين البالغين بين (14) من العمر (465) (05) أما البالغين بين (18-15) (118) (519)، (2020).
فتعتبر الرابطة الأمريكية (APA) في الإصدار الخامس الجديد للدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض (DSM-5) بأن العجز لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد : على شكل القصور في التواصل والتفاعل الاجتماعي وبمحدودية وتكرارية السلوكات، الاهتمامات والأنشطة، فهو اضطراب يندرج تحت تصنيف اضطرابات النمائية العصبية، بحيث تم الغاء تصنيفات التوحد المتمثلة في التوحد، متلازمة اسبرجر، متلازمة الريت، اضطراب الطفولة التفككي، اضطراب النمو الشامل غير المحدد حسب (السابق للدليل التشخيصي والإحصائي الإصدار الرابع، فيما تم اعتباره اضطراباً نمائياً عصبياً تندرج أعراضه من الشديد إلى الخفيف حسب الإصدار 2013 American Psychiatric Association) تتمكن بعض الحالات من اكتساب قدرات لغوية شبه عادية بينما تبقى الحالات الأخرى غير ناطقة ولا تكتسب قدرات لغوية، بحيث أن صعوبات التواصل الفظي لديهم تظهر في العجز عن توظيف اللغة في التواصل (Geib, 2018; Min & Wah, 2011; Farmer, 2003) .
فيمكن أن يقوم بتوظيف اللغة في المصادفة أو ترديد الكلام دون . يعرف معناه، أو من لقواعد لغوية للكلام يتميز بتنغيم وإيقاع شاذ مع عدم تمكّهم من اجل الطلب فقط، كما ان التوصل اللفظي لدى .
تندرج من عدم اكتساب تواصل لفظي، إلى اكتساب قدرة لفظية تفتقد للتوظيف النفعي، الاجتماعي، أو وجود نبرات صوت شاذة و (Nouf, 2015) .
اللتدريب المكثف في سبيل تعميمها لهم، إضافة لنقل اثر التدريب إلى البيئة المنزلية من أجل ترسیخ المكتسبات وتجنب نسيان المعلومة، غالباً ما يكونون عرضة للانتكasaة بفقدانهم للمهارات المكتسبة نتيجة (Warren, et al., 2011) .
كما يعتمد الأولياء على توجهات المختصين في تنفيذ الخطة التدريبية لتنمية مهارات ابناءه (Narzisi, 2020; Prata, Lawson, & Coelho).

في حين ان الظروف التي شهدتها العديد من الدول الحجر الصحي نتيجة لفيروس الكوفيد 19 (2020) إقرار العديد من الدول الحجر الصحي نتيجة لفيروس الكوفيد 19 حالت دون مواصلة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد للتدريب على مستوى المراكز والعيادات الخاصة، فادى ذلك لظهور (لديهم، فتوصلت دراسة Di Renzo, et al., 2020) على عينة من ، طيف التوحد بلغت (63٪) زيادة في معدل السلوكات النمطية والتكرارية لديهم بنسبة (30٪) من عينة الدراسة، بالإضافة لوجود توتر حركي لديهم اضطرابات في النوم نتيجة للحجر الصحي بسبب الكوفيد 19.

وهذا ما تؤكد دراسة (Amorim, Catarino, Miragaia, Ferreras, Viana, & Guardiano, 2020) على عينة من (56٪) ذوين نمو طبيعي (43٪) ، ذو اضطراب طيف ، أظهروا تغيراً في السلوك من خلال ظهور ذوي نمو طبيعي (43٪) ، ذو اضطراب طيف ، ارتفاع في مستوى القلق لدى أوليائهم، كما ان الأطفال لديهم، وجود مشكل في التحكم ، أمضوا فترة الحجر الصحي ببرنامج روتيني مبرمج أظهروا مستوى أقل من القلق مقارنة بالأطفال ، يتم برمجة برنامج روتيني يومي لهم. من خلال ما سبق جاءت هذه الدراسة للكشف عن مدى احتفاظ اطفال التوحد بالمهارات المكتسبة سابقاً من التدريب وال المتعلقة بالتواصل اللفظي بعد الانقطاع الطويل عن مراكز التأهيل ومدى تأثيرها بفترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19، ومنه تم طرح التساؤلات التالية:

٤١ تساؤلات الدراسة:

- خالل فترة الحجر الصحي جراء فيروس كوفيد 19 - هل توجد فروق في ، اللفظي لدى الطفل عن فيروس كوفيد 19 حسب الجنس؟
- خالل فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 - هل توجد فروق في ، التواصل اللفظي لدى الطفل عن فيروس كوفيد 19 .
- خالل فترة الحجر الصحي خالل فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 - هل توجد فروق في ، مستوى منخفض في جراء فيروس كوفيد 19.
- خالل فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 - هل توجد فروق في ، التواصل اللفظي لدى فيروس كوفيد 19 حسب الجنس.
- خالل فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 - هل توجد فروق في ، التواصل اللفظي لدى فيروس كوفيد 19 .
- خالل فترة الحجر الصحي خالل فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 - مدى مرتفع في لا

الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19

٤.٣ الهدف من الدراسة: تتجل أهداف الدراسة :

- التعرف على مستوى فيروس كوفيد 19.
- معرفة الفروق في عن فيروس 19 حسب الجنس.
- معرفة الفروق في التواصل اللفظي لدى عن فيروس كوفيد 19.
- نسخة مترادفة في تدريب الطفل الصي الناتجة عن فيروس كوفيد 19.
- الكشف على مستوى التواصل اللفظي لدى الناتجة عن فيروس كوفيد 19.
- الكشف عن تأثير التدريب ومواصلته خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 على تنمية التواصل اللفظي لدى.

٤.٤ أهمية الدراسة: همية الدراسة في النقاط التالية:

- تبرز هميّتها من خلال عينة الدراسة والتي تمثل في فئة الأطفال الذين لديهم اضطراب طيف توحد.
- الكشف على مستوى التواصل اللفظي لدى الناتجة عن فيروس كوفيد 19.
- الكشف عن تأثير التدريب ومواصلته خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 على تنمية التواصل اللفظي لدى.

٤.٥ التعريف الإجرائية:

مهارة التواصل اللفظي: به في الدراسة الحالية بأنه السلوكيات المنطقية التي يستخدمها أطفال عينة الدراسة متمثلة في قدرة الطفل على نطق الأصوات أو الكلمات، والتعبير بكلمة أو بجملة للتفاعل مع الآخرين من أجل هدف كتقليل الآخرين التعبير عن الذات أو طلب شيء أو التعليق حول مثير في البيئة باستخدام الكلام، وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل في مقياس هذه الدراسة.

اضطراب طيف التوحد: على تعريف الجمعية الأمريكية لتعريف طيف التوحد في الدراسة الحالية حسب الإصدار الخامس للدليل التشخيصي والإحصائي ، النفسيّة والعقلية، بأنه يظهر في الطفولة المبكرة، على شكل عجز أو قصور في التواصل والتفاعل والاهتمامات النمطية المتكررة والشاذة بحيث أنه في التعريف الجديد (DSM-5) تم الاستغناء عن وجود أنواع لاضطراب طيف التوحد، بل تم اعتباره اضطراباً واحداً تندرج أعراضه في الشدة من الخفيف، المتوسط، إلى الشديد، وعلمه يتم تحديد مستوى الخدمات .

فيروس كورونا كوفيد (19): حسب منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وكوفيد 19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات . ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيّه في مدينة ووهان الصينية في كانون 19/ديسمبر 2019. - 19 لأن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

٤ حدود الدراسة:

الحدود الزمانية و المكانية: تم تطبيق الدراسة إبتداء من يوم 10/10/2020 إلى 16/10/2020 على مستوى المراكز النفسية الجمعيات التوحد بولاية بغرداية.

الحدود البشرية: عينة الدراسة في أربعين(40) اضطراب طيف التوحد.

١ الطريقة والادوات:

١٢ منهج الدراسة : في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي الذي يستخدم في دراسة الاوضاع الراهنة للظواهر اشكالها وعلاقتها والعوامل المؤثرة في ذلك وهذا يعني أن المنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر والاحاديث ويشمل في الكثير من الاحيان على عمليات التنبؤ لمستقبل الظواهر والاحاديث التي يدرسها، ويقوم المنهج الوصفي على رصد ومتابعة دقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة معينة أو عدة فترات، من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون، والوصول إلى نتائج وتعليمات تساعد في فهم الواقع وتطوره (ربحي و عثمان ، 2000).

٢. مجتمع وعينة الدراسة:**٢.١. مجتمع وعينة الدراسة:**

تكون مجتمع الدراسة من (40) ، يتم التكفل بهم على مستوى المراكز النفسية والجمعيات بولاية غرداية، قام الباحث بتوزيع استمرارات مقياس مهارة التواصل اللفظي على مستوى المراكز والجمعيات، ليتم الإجابة على فقراتها من طرف أولياء الأطفال ذوي طيف التوحد، وفي الجدول (02) (03)

الجدول 01: توزيع عينة الدراسة الاساسية حسب المراكز والجنس.

الجنس		النسبة	مجتمع الدراسة	المراكز/ الجمعية
انثى	ذكور			
03	15	%45	18	المركز النفسي البيداغوجي ضاحية بن ضحوة
01	8	%22.5	9	
01	12	%32.5	13	
05	35	%100	40	

الجدول 02: وصف عينة الدراسة حسب الجنس.

النسبة المئوية	عدد الأفراد	المتغير
87,5%	35	
%12,5	5	

حسب الجدول رقم (01) (02) نجد أن العينة الممثلة في التوحد الذكور كان عددهم (35) طفلا بنسبة قدرت بـ (%87,5) التوحد الإناث كان عددهم (5) بنسبة قدرت بـ (%12,5) حيث نلاحظ ان عدد (02) من عدد الذكور في (02) وذلك لأن اضطراب طيف التوحد يصيب الاولاد الذكور أكثر من الاناث بنسبة (4) ذكور مقابل انثى واحدة (Centers of Disease Control and Prevention, 2020).

الجدول (03): توزيع عينة اطفال التوحد حسب السن.

التصنيف	المتغير	عدد الافراد
5		12
6		18
7		10
		40

حسب الجدول رقم (03) نجد ان عينة الدراسة تتراوح اعمارها . (5) (7) . 2 ادوات الدراسة:

2 1 3 مقياس مهارة التواصل اللفظي: تم الاعتماد في هذه الدراسة على مقياس " احمد علي، 2014"

بحيث يحتوي على بعدين، البعد الاول يقيس مهارات التواصل غير اللفظية ويحتوي على (28)

الثاني يقيس مهارات التواصل اللفظية لدى عينة الدراسة وتكون من (38) فقرة، ليكون العدد الإجمالي لفقرات المقياس (66) فقرة ، يتم تصحيحها بإعطاء ثلاثة درجات في حالة اختيار(نعم يفعل)، درجتين في حالة اختيار الإجابة (يفعل إلى حد)، إعطاء درجة واحدة في حالة ()، وذلك على جميع فقرات المقياس، وقد طبقه على عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في دراسة (2014) : "فاعلية برنامج معرفي الكتروني قائم على توظيف الانتباه الانتقائي في تحسين استجابات التواصل لدى اطفال التوحد " هي عينة قريبة من عينة الدراسة. في صورته النهائية (66) موزعة على بعد التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي، تم حساب الاتساق الداخلي للأداة من طرف صاحب المقياس وتبين ان جميع معاملات الارتباط لكل مفردة وبعد الذي تنتهي إليه دالة إحصائية اغلبها دالة عند (0.01)، كما تبين أن جميع معاملات الارتباط لكل مفردة ودرجة المقياس الكلية دالة (0.05) (0.94) (0.05) ، في حين بلغت قيمة الثبات عن طريق معايرة (0.97) النتائج سالفه الذكر نلاحظ ان المقياس صادق ويقيس ما صمم له كمسح كما انه يتمتع بمستوى

2 2 3 استماراة رصد ايام التدريب: تدريب الاولئاء لطفل ذي اضطراب طيف التوحد على مهارات التواصل اللفظي في فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كرونا الكوفيد 19، بحيث كانت بدائل الإجابة يوميا، مرتان في الأسبوع، مرة في الأسبوع، ولا مرة في الأسبوع.

4.2 المعالجة والاساليب الإحصائية المستخدمة:

2 4 1 المعالجة الإحصائية: عينة الدراسة جرى ترميزها وإدخال البيانات وتم معالجتها ببرنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

2 4 2 الاساليب الإحصائية المستخدمة:

- المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، التكرار، والنسبة المئوية.
- اختبار تحليل التباين الاحادي "One way-anova".
- "Independent t.test" لحساب الفروق لعينتين مستقلتين .

3 النتائج ومناقشتها:

- عرض ومناقشة الفرضية الأولى: تنص الفرضية الأولى على ما يلي: "مستوى انخفاض في مهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد خلال فترة الحجر الصحي جراء فيروس كوفيد 19". وبعد جمع البيانات التي تساعد في اختبار هذه الفرضية ثم تفريغها وتحليلها كما هو موضح في الجدول (04).

الجدول (04): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد خلال فترة الحجر الصحي جراء فيروس كوفيد 19.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	عدد الأفراد	المتغير
19.28	54.57	40	مهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب ، خلال فترة الحجر الصحي جراء فيروس كوفيد 19 -

وبناء على ما جاء في الجدول رقم (04) المتوسط الحسابي لمهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد هو مستوى اقل من متوسط المقياس الذي يقدر بـ (57)، وهو مستوى اقل من متوسط المقياس الذي يقدر بـ (54,57)، ومنه يمكن القول إن الفرضية الأولى تحققت اي ان هناك انخفاض في مستوى مهارة التواصل اللفظي لدى طفل فحصه جراء فيروس كوفيد 19.

في مستوى التواصل اللفظي لدى عينة الدراسة خلال فترة الحجر الصحي جراء فيروس كوفيد 19. اسباب تتدخل فيما بينها ولعل اهمها هو انتشار فيروس كوفيد 19، فدراسة (Dr. Sinéad Smyth, et al.2020) بجامعة دبلن، توصلت بـ (74%)

الاجتماعية نظرا لقلة التفاعلات اثناء الحجر الصحي، صعوبات في مغادرة المنزل والتعلق بالروتين المنزلي، والالتزام بالتباعد اخارج البيت، كما ان (61%) من عينة الدراسة اظهرت تراجعا في القدرة للتحكم في الذات، قصورا في الدافعية للمشاركة في الانشطة كالتمارين المنزلية (DCU's COVID-19 Research and Innovation Hub, 2020).

كذلك من اهم الاسباب لتراجع مستوى مهارة التواصل اللفظي لدى عينة الدراسة الخصائص المعرفية لدى الطفل اضطراب طيف التوحد وعدم قدرته على الاحتفاظ بالمعلومات كآثاره من الاطفال ذوي النمو الطبيعي، بسبب انقطاعهم عن التدريبات من خلال المراكز والجمعيات الخاصة بالتوحد حيث يشير (الزريقات، 2004) إلى ان القصور في الذاكرة القصيرة المدى والطويلة المدى يمكن أن تسبب قصورا في المهارات اللغوية لدى الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

عرض ومناقشة الفرضية الثانية: والتي تنص على ما : "توجد فروق في القدرة على مهارة التواصل اللفظي لدى طفل فحصه جراء فيروس كوفيد 19 حسب الجنس" وقد تم حساب الفروق باستعمال اختبار "لينينتين مستقلتين Independent t.test". وكانت النتائج كما هي موضح في الجدول (05):

الجدول (05): الفروق في القدرة على مهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد خلال فترة الحجر الصحي الناجمة عن فيروس كوفيد 19 حسب الجنس.

مستوى الدلالة	قيمة "ت"	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	عدد الأفراد	المتغير
0.109	1,643	19.90	56.42	35	الذكور
		4.50	41.60	5	الإناث

يبين الجدول رقم (05) أن المتوسط الحسابي للذكور والذين بلغ عددهم (35) (56.42) وانحراف معياري قيمته (19.90). أما بالنسبة للإناث الذين بلغ عددهم (5)، قدر المتوسط الحسابي (41.60) وانحراف معياري قيمته (4.50). حيث بلغت قيمة " المحسوبة (1.643) وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05)، مما يعني أنه لا توجد خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد.

19. سب الجنس بالتالي عدم تحقق الفرضية.

في انتشار الإصابة بطيف التوحد لدى الذكور بنسبة (04)

انثى واحدة(Centers of Disease Control and Prevention, 2020) كما تشير إحصاءات المركز الوطني للدراسات والتوثيق حول الأسرة والمرأة وجود الأطفال الذكور التوحديين على مستوى المراكز النفسية والبيداغوجية للمعاقين ذهنيا بنسبة (%) 24.27 (المركز الوطني للدراسات والاعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة و(2020). في حين بلغت نسبة الذكور في الدراسة الحالية (87.5%) على نتيجة دراسة التساؤل الثاني، يمكن تفسيرها بأن الطفل اضطراب طيف التوحد بغض النظر عن الجنس سواء كان ذكر أو انثى يملك تقريبا نفس الخصائص المعرفية، السلوكية، الانفعالية، الحركية، الاجتماعية واللغوية حيث بتعدد التعريفات بالنسبة لم يتم التفريق في الخصائص بين الجنسين فنجد أنه يتم ذكر كافة المعلومات المتعلقة بخصائص اضطراب طيف التوحد بصورة عامة دون التخصيص بالذكر سواء للذكور أو الإناث، إلا أنها تربط نسبة الإصابة بالتوحد لدى الذكور أكثر من الإناث (iancommunity.org, 2020; American Psychiatric Association, 2013; Autism Society, 2020; Centers for Disease Control and Prevention, 2020)

عرض ومناقشة الفرضية الثالثة والتي تنص على ما يلي: "توجد فروق في مهارة التواصل اللفظي لدى خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن كوفيد 19".

هو اختبار معلمي يهتم ببحث الفروق بين متوسطات درجات مجموعات كل متغير مستقل على المتغير التابع.

موضح في الجدول رقم (06).

الجدول (06): الفروق في مهارة التواصل اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 حسب السن.

المتغيرات	مجموع المربعات	درجة الحرية	متعدد المربعات	قيمة "F"	مستوى الدلالة
بين المجموعات	1080.431	2	540.215	1.488	0.239
	13431.344	37	363.009		
	14511.775	39			

حسب الجدول رقم (06) يوضح فروق في مهارة التواصل اللفظي لدى الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19، وبعد التحقق من تجانس المجموعات تم حساب تحليل التبيان الاحادي حيث قدرت قيمه () (1.488) عند مستوى الدلالة (0,239) وهي قيمة غير دالة لأنها أكبر من مستوى الدلالة

(0.05) بالتالي لا يوجد فرق في التباين بين المجموعات، حيث كان مجموع المربعات بين المجموعات يد
درجة الحرية (02) ومتوسط المربعات بين المجموعات يقدر بـ (540.215) ومجموع المربعات داخل المجموعات
درجة الحرية (37) ومتوسط المربعات داخل المجموعات يقدر بـ (363.009)، وقدر مجموع المربعات
(13431.344) عند درجة الحرية (39). ومنه عدم تحقق الفرضية اي لا توجد فروق في مهارة
خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس ك (19).

فحسب نتائج الدراسة الحالية يمكننا القول بأنه لا توجد فروق في التواصل اللغطي لدى (6) والذي يمكن أن يكون لكون الفئات العمرية كانت متقاربة جداً والمتمثلة في سن (5) (7) سنوات والذين يدخلون في نفس مرحلة النمو المتمثلة في الطفولة الثانية والمتميزة بنفس الخصائص عموماً عند الأطفال العاديين وغير العاديين التوحد بصفة خاصة لاشتراكهم في ميزة عدم التواصل مع الآخرين. وقد قدم الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية والعقلية الإصدار الخامس ملامح صورة إكلينيكية للطفل ذي اضطراب من بينها الاختلال في التواصل مع الآخرين والتي تشتمل المهارات اللغوية وغير اللغوية كالإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه. وقد تغيب اللغة الكلية، وقد يوجد لغة شاذة دون معنى وهدف، فالبعض منهم يردد أحياناً كلاماً غير مفهوم واستعمال الصيغ بشكل خاطئ (2013 American Psychiatric Association 2018).

عرض ومناقشة الفرضية الرابعة: والتي تنص على ما يلي: " استمرارية في تدريب الطفل مهارة التواصل اللفظي خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس ١٩ - وقد تم حسابها عن طريق التكرارات والنسب المئوية. وكانت النتائج كما هي موضح في الجدول (07):
الجدول (07): بوضوح مدى استمرارية التدريب على مهارة التواصل اللفظي في فترة الحجر الصحي الناتجة عن الكوفيد ١٩.

المجموع	ولا مرة في الأسبوع	مرة في الأسبوع	مرتان في الأسبوع	يومياً
120	40	19	21	3
	%47,5	%52,5	%72,5	%27,5
			%87,5	%12,5
				%92,5
				%7,5

نلاحظ من خلال الجدول رقم (07) الذي يوضح في تدريب الطفل ذي طيف التوحد على مهارة التواصل فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 من طرف الوالدين، أن نسبة تكرار التدريب اليومي تقدر بـ (92,5) اكبر بكثير من نسبة بنعم والتي قدرت بـ (7,5) اي ان الاولياء لم يقوموا بالتدريب على مهارة التواصل اللفظي . كما نلاحظ أن نسبة تكرار الإجابات بـ () المتعلقة بممارسة التدريب مررتان في الاسبوع تقدر (87,5%) وهي اكبر بكثير من نسبة بنعم والتي قدرت بـ (12,5) الاولياء الذين لم يقوموا بالتدريب ولو مررتان في الاسبوع هم النسبة الاكبر. ايضا نلاحظ ان نسبة تكرار الإجابات بـ () المتعلقة بممارسة التدريب مرة في الاسبوع تقدر (72,5%) وهي اكبر بكثير من نسبة الإجابة بنعم والتي قدرت بـ (27,5%) اي ان النسبة الاكبر لصالح الاولياء الذين لم يقوموا بالتدريب ولا مرة في الاسبوع.

إضافة لذلك نلاحظ أن نسبة تكرار الإصابة (%) وهي أكبر (52.5%) المتعلقة بعدم ممارسة التدريب ولا مرة في (%) التي تخص الأولياء الذين قاموا بالتدريب والتي قدرت، أي أن أغلبية الأولياء لم يقوموا مرة في الأسبوع. وقد يعود ذلك لعدة أسباب تختلف من أسرة لأخرى قد تكون لظروف صحية، نفسية، اجتماعية أو اقتصادية او نتيجة للفروق في المستوى التعليمي، فدراسة (Colizzi , Sironi, Antonini , Ciceri, Bovo , & Zocante, 2020) توصلت إلى وجود صعوبات لدى (93.3%) عائلة لذوي الأطفال طيف التوحد من عينة الدراسة في تسخير الانشطة اليومية أثناء الحجر الصحي، خاصة في أوقات الفراغ والأنشطة المنظمة والمحددة، إضافة لـ (41.5%) الدراسة اظهروا توبراً لا تكيفية، فيالرغم من تعدد الأسباب يظهر جلياً ان انعدام التدريب يؤثر في مهارة التواصل الفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد الذي يحتاج للمواصلة وعدم الانقطاع . التدريب، فمدى تدريب الطفل ذي طيف التوحد على مهارة التواصل الفظي من طرف أوليائهم خلال فترة الحجر الصحي تفسر في حد ذاتها انخفاض التواصل الفظي لدى عينة هذه الدراسة خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19.

فيعتبر التدريب المكثف والمتواصل للطفل ، طيف التوحد من أهم العوامل لتحسين من شدة الاعراض لديهم وتحسين حياتهم وحياة الأفراد المحيطين بهم. فالطفل الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد لا يستطيع التفاعل مع الآخرين والاندماج في المجتمع، فهو منشغل بذاته بشكل نمطي، ومنطوي على نفسه، يرفض التواصل مع الآخرين ويتميز بتبدل المشاعر والاحاسيس حيث تختلف شدة الاضطراب من طفل لآخر لذا يجب على الأولياء الاستمرار في المحاولة للتواصل معهم ويكون ذلك عن طريق التدريب سواء اكان بشكل يومي او متقطع نظراً لأهميةه لدى هذه الفئة، خاصة في ظل الظروف التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 . قطاع خدمات التكفل، تاهيل وتدريب ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث تؤكد دراسة (2001 على ذلك في قولها)" وللحد من صعوبات اللغة والتواصل التي يعاني منها الأطفال ذوو اضطراب التوحد فان محاولات التدخل بالبرامج التدريبية، و التاهيلية يعد ضرورياً وهاماً لتطوير قدرة هؤلاء الأطفال على التواصل مع الآخرين وذلك بتعليمهم وتدريبهم على كيفية التعبير عن حاجياتهم وأحساسهم ومشاعرهم بأكثر من أسلوب ويتم ذلك من خلال توفير البيئة المواتية ليتعلم الطفل فيها على مهارات تقليل بعض الاصوات والحركات والافعال، والانتباه لمثير معين من بين عدد من المثيرات والاستجابة لآوامر معينة والإفصاح عما يريد الطفل، وتسمية بعض الصور أو الأشياء" (2001).

اذ يستطيع الأولياء مواصلة التدريب ولو عن طريق اللعب الذي يعد أحد أهم الوسائل التعليمية للأطفال التوحدي خاصه وتوارد (2004) باتفاق معظم الدراسات والباحثات على أهميته وفاعليته في تنمية مختلف المهارات لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد باسلوب شيق وممتع وفي ملء اوقات فراغهم بشكل ينفعهم (2015).

4 خلاصة:

الحالية موضوع التواصل الفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد .
الصحي الناتجة عن فيروس كوفيد 19 .
وخصائص الاضطراب تفرض على القائمين برعاية هاته الفتة الحفاظ على استمرارية التدريب على مختلف المهارات، خاصة أثناء الظروف التي شهدتها العالم سنة (2020) نتيجة الكوفيد-19 .
ومن خلال البحث الحالي : لنتائج تمثل في
نترة الحجر الصحي، إضافة لعدم وجود فروق في مستوى والجنس عدم وجود
استمرارية اضطراب طيف التوحد على التواصل الفظي خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن كوفيد-19 .

- من نتائج البحث تظهر حاجة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لبدائل تدريبية لا تعتمد على الحضور الجسدي للمراكز أو العيادات التاهيلية، ومنه تم اقتراح بعض التوصيات فيما يلي:
- إجراء دراسة حول تأثير كوفيد 19 على التواصل غير اللفظي لدى الطفل ذي اضطراب طيف التوحد في فترة الحجر الصحي.
 - مسحية لعينات لاطفال ذوي اضطراب التوحد بمناطق اخرى ومتعددة، وشريحة اكبر للتعرف اكثر على تأثير الحجر الصحي الناتج عن فيروس كوفيد 19 على الاطفال ذوي اضطراب طيف سواء من ناحية المكتسبات او الجانب النفسي.
 - بناء برامج تدريبية حول التواصل اللغوي لدى فظي وغير فظي وغیر فظي.
 - مساعدة ابائهم على تنمية التواصل لديهم ومحاوله إدماجهم داخل الاسرة والمجتمع.
 - محاولة إيجاد طرق للتواصل مع أولياء الاطفال من طرف المراكز البيداغوجية النفسيه الخاصة باهتمامات خلال الازمات وخاصة في وجود الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل والتطبيقات التي يمكن التواصل بها مباشرة وحضور تدريبات للأولياء ونصائح تساعدهم على محاولة مواصلة تدريب الطفل اضطراب طيف التوحد.

References

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition*. (A. P. Association, Éd.) Arlignton , VA.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition*. (A. P. Association, Éd.) Arlignton , VA.
- Amorim, R., Catarino, S., Miragaia, P., Ferreras, C., Viana, V., & Guardiano, M. (2020). *Impacto de la COVID-19 en niños con trastorno del espectro autista*. REV NEUROL, 71(8), 285-291. doi:<https://doi.org/10.33588/rn.7108.2020381>
- Autism Society. (2020). [autism-society.org](https://www.autism-society.org/). Récupéré sur autism-society.org/what-is/: <https://www.autism-society.org/what-is/>
- Brahim Abdullah Faraj Al-Zureikat. (2004). *Autism: characteristics and treatment*. Beirut: Dar Al Uloom for investigation, printing, publishing and distribution.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020, 04 11). *Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder*. Récupéré sur Centers for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html>
- Centers of Disease Control and Prevention. (2020, September 25). <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html>. Récupéré sur <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html>
- Colizzi , M., Sironi, E., Antonini , F., Ciceri, M., Bovo , C., & Zoccante, L. (2020). *Psychosocial and Behavioral Impact of COVID-19 in Autism Spectrum Disorder: An Online Parent Survey*. Brain Sciences, 10(6), 341. doi:<https://doi.org/10.3390/brainsci10060341>
- Development in Children with Autism Spectrum Disorders*. 13-14-15-16. Seattle Pacific University , Doctoral Thesis In Clinical Psychology. Récupéré sur https://digitalcommons.spu.edu/cpy_etd/32
- Farmer, J. K. (2003). *The Effect of Music vs. Nonmsic Paired with Gestrues on Spontaneous Verbal and Nonverbal Communication Skills of Children with Autism Between the Ages 1-5*. 6-7. Florida State University, School of Music , Master Thesis.

- Geib, F. E. (2018, May). The Role of Joint Attention in Pragmatic Language Development in Children with Autism Spectrum Disorders. 13-14-15-16. Seattle Pacific University , Doctoral Thesis In Clinical Psychology.
- Handle the Autism Spectrum Condition During Coronavirus (COVID-19) Stay At Home period: Ten Tips for Helping Parents and Caregivers of Young Children 2020 *Brain Sciences* 207102-4
- Hossam Mohamed Ahmed Ali. (2014). *The effectiveness of an electronic cognitive program based on the use of selective attention in improving communication responses in autistic children*. Master Thesis, South Valley University. Retrieved from <https://teachingskills.org/iancommunity.org/>. (2020). https://iancommunity.org/cs/autism/icd10_criteria_for_autism. Récupéré sur https://iancommunity.org/cs/autism/icd10_criteria_for_autism
- Impacto de la COVID-19 en niños con trastorno del espectro autista 2020 *REV NEUROL* 718285-291
- Mahmoud Abdel-Rahman Al-Sharqawi. (2018). *Autism and means of treatment*. Publisher: Science and Faith for Publishing and Distribution.
- Min, H. L., & Wah, L. L. (2011, December). *Teaching of Speech, Language and Communication Skills for Young Children with Severe Autism Spectrum Disorders: What Do Educators Need to Know*. *New Horizons in Education*, 59(3), 19. Récupéré sur <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ955538.pdf>
- Mustafa ElyanRabhi, and Mohamed Ghoneim Othman. (2000). *Scientific Research Approaches and Methods: Theory and Practice* (Edition 1F). Amman: Safaa House for Publishing and Distribution.
- Narzisi, A. (2020). Handle the Autism Spectrum Condition During Coronavirus (COVID-19) Stay At Home period: Ten Tips for Helping Parents and Caregivers of Young Children. *Brain Sciences*, 207(10), 2-4.
- Parent training for parents of children on the autism spectrum: a review 2018 *CLINICAL NEUROSCIENCES AND MENTAL HEALTH* 532-9
- Prata, J., Lawson, W., & Coelho, R. (2018). Parent training for parents of children on the autism spectrum: a review. *CLINICAL NEUROSCIENCES AND MENTAL HEALTH*, 5(3), 2-9.
- Rima Malik Fadel. (2015). *The effectiveness of a training program using play in developing some language communication skills for children with autism*. 58-59. Damascus University. Faculty of Education. Research submitted to obtain a master's degree in language and speech evaluation. Unpublished thesis.
- Soha Ahmed Amin Nasr. (2001). *How effective is a treatment program for developing language communication in some autistic children*. PhD Thesis, Institute of Graduate Studies for Childhood, Ain Shams University.
- Teaching of Speech, Language and Communication Skills for Young Children with Severe Autism Spectrum Disorders: What Do Educators Need to Know 2011 *New Horizons in Education* 59319
- The Effect of Music vs. Nonmsic Paired with Gestures on Spontaneous Verbal and Nonverbal Communication Skills of Children with Autism Between the Ages 1-5 2003 6-7 Florida State University, School of Music , Master Thesis
- The National Center for Studies, Media and Documentation on the Family, Women and Childhood .(2020) <http://www.cneidffe.gov.dz/wp-content/uploads/2020/09/>
- The Role of Joint Attention in Pragmatic Language Development in Children with Autism Spectrum Disorders 13-14-15-16 Seattle Pacific University , Doctoral Thesis In Clinical Psychology

- Therapies for Children With Autism Spectrum Disorders* 2011 Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality Prepared by the Vanderbilt Evidence-based Practice Center under Contract No.290-2007-10065-I.) AHRQ Publication No. 11-EHC029-EF
- Wafa Ali Al-Shami. (2004). *Autism treatment* (version i 1). Riyadh: King Fahd National Library.
- Warren , Z., Veenstra-VanderWeele , J., Stone , W., Bruzek , J., Nahmias , A., Foss-Feig , J., et al. (2011). *Therapies for Children With Autism Spectrum Disorders* (éd. Comparative Effectiveness Review No. 26). Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality: Prepared by the Vanderbilt Evidence-based Practice Center under Contract No.290-2007-10065-I.) AHRQ Publication No. 11-EHC029-EF.

المراجع

- براهيم عبد الله فرج الزريقات. (2004). *التوحد : الخصائص والعلاج*. بيروت: دار العلوم للتحقيق والطباعة و النشر والتوزيع.
- حسام محمد أحمد علي. (2014). فاعلية برنامج معرفي الكتروني قائم على توظيف الانتباه الانتقائي في تحسين استجابات التواصل لدى أطفال التوحد. رسالة ماجستير، جامعة جنوب الوادي Retrieved from <https://teachingskills.org>.
- محمود عبد الرحمن الشرقاوي. (2018). *التوحد ووسائل علاجه . العلم والإيمان للنشر والتوزيع*.
- مصطفى عليان ربحي ، و محمد غنيم عثمان . (2000). *مناهج واساليب البحث العلمي : النظرية والتطبيق* (الإصدار ط1). دار صفاء للنشر والتوزيع.
- ريما مالك فاضل. (2015). فاعلية برنامج تدريسي باستخدام اللعب في تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد. 59. جامعة دمشق . كلية التربية . بحث مقدم لنيل شهادة درجة الماجستير في تقويم اللغة و الكلام . رسالة غير منشورة.
- سمى احمد أمين نصر. (2001). *مدى فاعلية برنامج علاجي لتنمية الاتصال اللغوي لدى بعض الاطفال التوحديين*. دكتوراه، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- <http://www.cneidffe.gov.dz/wp-> . (2020) . المركز الوطني للدراسات و الاعلام و التوثيق حول الاسرة و ا content/uploads/2020/09/
- وفاء علي الشامي. (2004). *علاج التوحد* (الإصدار ط1). مكتبة الملك فهد الوطنية